

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE

CONDILOMA ACUMINADO

São lesões verrucosas (também chamadas condilomas acuminados), que ocorrem usualmente nas regiões genitais, perineal e canal anal. É adquirido por contato sexual sendo muito frequente atualmente. Ambos os sexos são afetados.

É causado pelo papiloma vírus humano (HPV).

Tem potencial para desenvolver lesões malignas, como cânceres cervical e anal.

QUADRO CLÍNICO

- Prurido anal.
- Dor.
- Sangramento anal.

DIAGNÓSTICO

- História clínica e exame físico proctológico.
- Anuscopia com magnificação de imagem.
- Biópsias (exame histopatológico).

TRATAMENTO

- Tratamento medicamentoso.
- Crioterapia.
- Tratamento cirúrgico (ressecção cirúrgica e a cauterização).

Referências bibliográficas

Tratado das Enfermidades Gastrointestinais e Pancreáticas | 1º Edição

Tratado de Gastroenterologia | FBG 2º Edição

Clínica Médica | Doenças do Aparelho Digestivo – FMUSP 2º Edição

Tratado de Clínica Cirúrgica | HC-FMUSP 1º Edição

Tratado de Clínica Cirúrgica do Sistema Digestório | Intestino Delgado | FMUSP

Tratado de Coloproctologia | SBCP 1º Edição

Manual ASCRS de Cirurgia de Cólon e Cirurgia Retal | 3º Edição