

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO PARA OS ADULTOS

Vacinas	Sim	Não	N/S
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)			
Hepatites A, B ou A e B			
HPV			
Tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche) dTpa			
Dupla adulto (difteria e tétano) dT			
Varicela (catapora)			
Influenza (gripe)			
Meningocócicas conjugadas ACWY/C			
Meningocócica B			
Febre amarela			
Pneumocócicas conjugadas (VPCIO ou VPC13)			
Pneumocócica polissacarídica 23-valente (VPP23)			
Herpes-zóster			
Dengue			

Fonte: SBIm, 2020/2021.

ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO VACINAL

Vacinas vivas ou atenuadas	Vacinas não vivas ou inativas
<ul style="list-style-type: none"> Sarampo, rubéola e caxumba Varicela Herpes-zóster BCG Febre amarela Poliomielite oral Febre tifoide oral Influenza - spray nasal 	<ul style="list-style-type: none"> Difteria, tétano e coqueluche Hepatite A e B Influenza - parenteral Meningococo Pneumococo <i>Haemophilus influenzae B</i> Poliomielite parenteral Raiva

SUSPENSÃO DA TERAPIA IMUNOSSUPRESSORA PARA A VACINAÇÃO

Drogas	Intervalo para a vacinação
Corticoides (Prednisona ou equivalente)	Um mês
Metotrexato	Um a três meses
Sulfassalazina	Nenhum
Azatioprina	Três meses
Ciclosporina	Três meses
Tacrolimus	Três meses
6-mercaptopurina	Três meses
Biológicos: anticitocinas e inibidores da coestimulação do linfócito T	Três meses, mínimo de cinco meias-vidas, ou o que for menor
Biológicos depletors de linfócitos B	Seis meses
Sintéticos alvo-específicos: inibidores da JAK (Tofacitinibe)	Dois semanas

Observações: vacinar, preferencialmente, antes da imunossupressão. Vacinas inativadas devem ser administradas, pelo menos, 14 dias antes do início da terapia imunossupressora e as vivas atenuadas, idealmente, quatro semanas antes. Na impossibilidade de aguardar, manter um intervalo mínimo de duas semanas.

ATENÇÃO!

No que se refere ao período de suspensão da aplicação dos biológicos antes e após o uso de vacinas, com agentes vivos ou atenuados, recomenda-se suspender o imunobiológico, ao menos, 4-5 meias-vidas antes da vacinação e aguardar, ao menos, 30 dias após a vacinação para a sua reintrodução.

- Suspender o biológico
- Aguardar 4-5 meias-vidas
- Vacinar
- Aguardar, no mínimo, 4 semanas (30 dias)
- Reintroduzir o biológico