

MANEJO CLÍNICO DURANTE A TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA

Exames	Pré	4 semanas	12 semanas	Trimestral
Hemograma completo	•	•	•	•
Enzimas hepáticas	•	•	•	•
Função renal	•	•	•	•
Urina Tipo 1	•	•	•	•
Teste de gravidez	•			
Sorologia HIV	•			
Sorologia Hepatite B	•			
Sorologia Hepatite C	•			

Fonte: PATHIRANA et al., JEADV, 2009; 23 (Suppl.2): 5-70.

Teste	Ínicio	3 meses	6 meses	12 meses	Acompanhamento
IADC	•	•	•	•	A cada 3 meses
Exame físico completo	•	•	•	•	Toda consulta
Triagem de tuberculose: raio X de tórax, PPD / IGRA	•			•	Todo ano, se o PPD negativo
Exames de sangue: hemograma, VHS, PCR	•	•	•		A cada 6 meses
Função renal	•	•	•		A cada 6 meses
Função hepática	•	•	•		A cada 6 meses
Teste de gravidez	•				Depende do risco

MONITORAMENTO DURANTE O USO DE TOFACITINIBE

Período	Linfócitos	Neutrófilos	Hemoglobina	Lipídios
No início	•	•	•	
4 a 8 semanas após o início		•	•	•
Subsequent. a cada 3 meses	•	•	•	